

DERMOCORTAL 5 MG/G CREME

HYDROCORTISON

TUBE ZU 20 G


ZUR ANWENDUNG AUF DER HAUT

ZUL.-NR. 025774011

PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.

Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

**Gebrauchsinformation: Information für Anwender****Dermocortal 5 mg/g Creme**

Hydrocortison

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Sollte nach einigen Tagen keine Besserung eintreten oder es gar zu einer Verschlimmerung der Symptome kommen, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Dermocortal und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Dermocortal beachten?
3. Wie ist Dermocortal anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Dermocortal aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Dermocortal und wofür wird es angewendet?

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn es Ihnen nach einigen Tagen nicht besser oder gar schlechter geht.

Dermocortal enthält den Wirkstoff Hydrocortison, der einer Arzneimittelgruppe angehört, die als Corticosteroide bezeichnet wird. Hydrocortison trägt dazu bei, lokale Entzündungen, Schwellungen und Juckreiz zu lindern.

Dieses Arzneimittel ist angezeigt zur Behandlung von:

- Insektenstichen;
- örtlichem Juckreiz und Verbrennungen;
- Hautentzündung (Ekzeme).

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Dermocortal beachten?**Dermocortal darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- wenn Sie an einer durch Viren, Bakterien oder Pilzen verursachten Infektion leiden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Dermocortal anwenden.

Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden:

- an den Augen und auch nicht in der Augenpartie
- zur längeren Behandlung von Scheidensjucken bei Scheidenausfluss

- zur längeren Behandlung oder zur Behandlung größerer Hautflächen. Nach einer kurzen Behandlungsdauer ohne Behandlungserfolg sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen. Insbesondere die langfristige Anwendung von Produkten zur Anwendung auf der Haut (örtliche Behandlung) kann zu Sensibilisierungserscheinungen führen (übermäßig starke Reaktion des Körpers auf Fremdstoffe, mit denen er in Kontakt gerät). In diesem Fall müssen Sie **die Behandlung unterbrechen** und Rücksprache mit Ihrem Arzt halten, um eine geeignete Behandlung einzuleiten (siehe Abschnitt 3 „Wenn Sie eine größere Menge von Dermocortal angewendet haben, als Sie sollten“).

Kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie verschwommenes Sehen oder andere Sehstörungen bekommen

Kinder

Bei Kindern unter 2 Jahren ist das Arzneimittel nur wenn unbedingt notwendig und nur unter direkter ärztlicher Kontrolle anzuwenden. Wenden Sie sich vor der Anwendung von Dermocortal bei Kindern unter 2 Jahren an Ihren Arzt.

Dieses Arzneimittel ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

Anwendung von Dermocortal zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Während der Schwangerschaft sollten Sie dieses Arzneimittel nur auf Empfehlung des Arztes und unter dessen Kontrolle anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Dieses Arzneimittel beeinträchtigt nicht die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Dermocortal enthält Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat: Diese Stoffe können (auch tardive) allergische Reaktionen verursachen.

3. Wie ist Dermocortal anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel stets genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben oder gemäß den Anweisungen des Arztes oder des Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt 2 – 3 Anwendungen pro Tag. Eine dünne Schicht Creme auf den erkrankten Hautbereich auftragen und leicht einmassieren.

Achtung: Ohne Rat des Arztes die angegebenen Dosen nicht überschreiten und das Arzneimittel nur für einen kurzen Behandlungszeitraum anwenden.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn die Erkrankung wiederholt auftritt oder wenn Sie eine Veränderung der Krankheitsmerkmale feststellen.

Wenn Sie eine größere Menge von Dermocortal angewendet haben, als Sie sollten

Bei der Anwendung über einen längeren Zeitraum oder auf einer großen

Hautfläche können Hautreizungen und Sensibilisierung auftreten.
In diesem Fall sollten Sie die Behandlung **abbrechen** und sich an Ihren Arzt oder Apotheker wenden.

Wenn Sie Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Verschwommenes Sehen mit unbekannter Häufigkeit.
Durch Einhalten der in dieser Packungsbeilage enthaltenen Anweisungen wird das Risiko für Nebenwirkungen reduziert.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem auf der Website <http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Dermocortal aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Dermocortal enthält

- Der Wirkstoff ist: Hydrocortison. 1 g Creme enthält 5 mg Hydrocortison.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Glycerolpalmitatstearat und Polyethylenpalmitatstearat in Kombination mit polyoxyethyliertem Cetylstearylalkohol, polyglycolisierte Isostearinglyceride, Glycerilmonostearat, Phenoxyethanol, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat, Isostearylisostearat, flüssiges Paraffin, Duftessenz, gereinigtes Wasser.

Wie Dermocortal aussieht und Inhalt der Packung

Dermocortal ist eine in einer Tube aus Aluminium zu 20 g enthaltene Creme.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. – Via Cavour, 70 – 27035 Mede (PV)

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2017