

Außenetikett / Innenetikett

[Logo: rezeptfrei erhältliches Arzneimittel]

**STREPTOSIL mit NEOMYCIN 2% + 0,5% Salbe****Sulfathiazol + Neomycinsulfat****ANWENDUNG AUF DER HAUT**

Salbe 20 g

ZUSAMMENSETZUNG

20 g Salbe enthalten: Wirkstoffe: Sulfathiazol 0,4 g, Neomycinsulfat 0,1 g.
Hilfsstoffe: flüssiges Paraffin, weiße Vaseline, weißes Wachs.

DOSIERUNG

2- bis 3-mal täglich eine dünne Schicht Salbe auftragen. Die empfohlenen Dosen nicht überschreiten.

ANWENDUNGSGEBIETE

Oberflächliche Hautinfektionen (Follikulitis, Furunkulose, kleine Verbrennungen und infizierte Wunden).

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Siehe Packungsbeilage.

ARZNEIMITTEL AUSSERHALB DER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Achtung: Für die Anwendung aufmerksam die beiliegenden Anweisungen lesen.
Verw. bis: (Monat, Jahr)

Das angegebene Verfallsdatum gilt für das Produkt in der ungeöffneten, korrekt aufbewahrten Verpackung.

Das Behältnis ordnungsgemäß entsorgen.

ZULASSUNGSINHABER

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24


17489 Greifswald - Deutschland

Zul.-Nr. 023589043

Ch.-B.

ARZNEIMITTEL ZUR SELBSTMEDIKATION

Achtung: Vor der Anwendung aufmerksam die Packungsbeilage lesen.

**Gebrauchsinformation: Information für Anwender Streptosil mit Neomycin 99,5% + 0,5% Pulver zur Anwendung auf der Haut****Streptosil mit Neomycin 2% + 0,5% Salbe**

Sulfathiazol + Neomycinsulfat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach den Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

- Wenn Sie sich nach einigen Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Streptosil mit Neomycin und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Streptosil mit Neomycin beachten?
3. Wie ist Streptosil mit Neomycin anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Streptosil mit Neomycin aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Streptosil mit Neomycin und wofür wird es angewendet?

Streptosil mit Neomycin ist ein Arzneimittel, das auf die Haut aufgetragen wird und Neomycinsulfat und Sulfathiazol enthält.

Neomycinsulfat ist ein Antibiotikum. Sulfathiazol ist ein antibakterieller Wirkstoff. Sie werden angewendet, um bakterielle Hautinfektionen zu bekämpfen.

Dieses Arzneimittel ist bei Erwachsenen und Kindern für die Behandlung oberflächlicher Hautinfektionen angezeigt:

- Follikulitis (Infektion des Haarbalgs, der Struktur, die die Haarwurzel umgibt);
- Furunkulose (durch das Vorliegen von Furunkeln gekennzeichnete Hautentzündung);
- Wunden durch kleine Verbrennungen;
- infizierte Wunden.

Wenn Sie sich nach einigen Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Streptosil mit Neomycin beachten?**Streptosil mit Neomycin darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Sulfathiazol oder Neomycinsulfat oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- bei Ohrinfektionen;
- in der Nähe der Augen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Streptosil mit Neomycin anwenden.

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Anwendung im Auge bestimmt; es ist nur zur äußeren Anwendung bestimmt und darf nicht eingenommen werden.

Wenden Sie Streptosil mit Neomycin nicht über längere Zeiträume oder in großen Mengen auf ausgedehnten Hautbereichen an, da das in diesem Arzneimittel enthaltene Neomycinsulfat zu Nieren- oder Ohrproblemen führen kann.

Wenden Sie dieses Arzneimittel in folgenden Fällen nicht an:

- bei sekundären Hautinfektionen (Infektionen, die sich in bereits bestehenden

Hautverletzungen entwickeln);

- bei ausgedehnten Verbrennungen;
- bei trophischen Geschwüren (Hautverletzungen aufgrund einer beeinträchtigten Blutzirkulation);
- in Situationen, in denen die Absorption von Neomycin möglich ist.

Wenn Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum anwenden, kann es eine Allergie auslösen.

Wenn Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum und auf unangemessene Weise anwenden, könnte es zu einem übermäßigen Wachstum von nicht empfindlichen Bakterien oder Pilzen und zu Antibiotikaresistenz kommen, wodurch sich die Situation verschlechtert.

Wenn dies geschieht, müssen Sie die Behandlung abbrechen und sich an den Arzt wenden.

Säuglinge und Kinder

Wenden Sie Streptosil mit Neomycin bei Säuglingen und Kleinkindern nur wenn nötig und unter direkter ärztlicher Kontrolle an. Wenden Sie dieses Arzneimittel bei Säuglingen mit Windeldermatitis nicht auf ausgedehnten Bereichen wunder Haut an, da die Windel wie ein Okklusivverband wirken und die Absorption von Neomycin begünstigen könnte.

Andere Arzneimittel und Streptosil mit Neomycin

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Wenden Sie keine anderen Aminoglykoside, d. h. Neomycin ähnliche Arzneimittel, an, während Sie dieses Arzneimittel anwenden, da die gleichzeitige Anwendung das Risiko für toxische Wirkungen auf die Ohren und Nieren erhöhen könnte.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind, vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, oder wenn Sie stillen, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wenden Sie Streptosil mit Neomycin während der Schwangerschaft und Stillzeit nur wenn nötig und unter direkter ärztlicher Kontrolle an.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Streptosil mit Neomycin hat keine Auswirkungen auf die Fähigkeit, Fahrzeuge zu führen und Maschinen zu bedienen.

3. Wie ist Streptosil mit Neomycin anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage

beschrieben bzw. genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Pulver zur Anwendung auf der Haut

Die empfohlene Dosis ist 2 Anwendungen täglich. Die empfohlenen Dosen nicht überschreiten.

Ziehen Sie die Kappe hoch, halten Sie die Flasche waagrecht oder leicht schräg und drücken Sie die beiden Seiten der Flasche rhythmisch und fest zusammen; spritzen Sie das Pulver dünn auf den betroffenen Hautbereich und decken Sie diesen mit steriler Gaze ab. Spritzen Sie das Pulver dünn auf und verwenden Sie die geringstmögliche Menge, um die Bildung von Krusten zu vermeiden und die rasche Auflösung und Diffusion der Bestandteile zu ermöglichen.

Salbe

Die empfohlene Dosis ist eine Anwendung 2- bis 3-mal täglich. Die empfohlenen Dosen nicht überschreiten.

Tragen Sie eine geringe Menge Salbe auf den betroffenen Bereich auf.

Wenn Sie eine größere Menge von Streptosil mit Neomycin angewendet haben, als Sie sollten

Es wurden keine Symptome aufgrund der Anwendung einer übermäßigen Dosis von Streptosil mit Neomycin gemeldet.

Wenn Sie glauben, dass Sie eine übermäßige Dosis dieses Arzneimittels angewendet haben, brechen Sie die Behandlung ab und wenden Sie sich an den Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Anwendung von Streptosil mit Neomycin vergessen haben

Wenden Sie zum Ausgleich der vergessenen Dosis keine doppelte Dosis an.

Wenn Sie die Behandlung mit Streptosil mit Neomycin abbrechen

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

Infektionen und parasitäre Erkrankungen

Superinfektionen durch Bakterien und Pilze.

Erkrankungen des Immunsystems

Überempfindlichkeitsreaktionen.

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Juckreiz.

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Schwellung, Rötung.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem unter der Adresse <http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Streptosil mit Neomycin aufzubewahren?

Dieses Arzneimittel außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Streptosil mit Neomycin enthält

Pulver zur Anwendung auf der Haut

- Die Wirkstoffe sind: Sulfathiazol und Neomycinsulfat;

- Sonstige Bestandteile: keine.

Salbe

- Die Wirkstoffe sind: Sulfathiazol und Neomycinsulfat;

- Die sonstigen Bestandteile sind: flüssiges Paraffin, weiße Vaseline, weißes Wachs.

Wie Streptosil mit Neomycin aussieht und Inhalt der Packung

Streptosil mit Neomycin 99,5% + 0,5% Pulver zur Anwendung auf der Haut

Erhältlich in Kunststoffflaschen zu 10 g mit Verschluss mit Öffnung in der Mitte.

Streptosil mit Neomycin 2% + 0,5% Salbe

Erhältlich in Aluminiumtuben zu 20 g.

Zulassungsinhaber

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald - Deutschland

Telefon: 03834/8539-0

Fax: 03834/8539-398

Hersteller

Haupt Pharma Latina S.r.l. – Borgo S. Michele (LT)

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Bahnhofstr. 1a

17498 Mesekenhagen - Deutschland

Diese Packungsbeilage wurde aktualisiert im 10/2018