LOPERAMIDE HEXAL 2 mg Hartkapseln

Generikum

LOPERAMIDE HEXAL 2 mg Hartkapseln

Jede Kapsel enthält:

Wirkstoff: Loperamidchlorhydrat 2 mg entspr. Loperamid 1,8 mg**Sonstige Bestandteile:** Lactose, Maisstärke, Magnesiumstearat, Talkum

Körper der Kapsel: Gelatine, schwarzes Eisenoxyd (E172), Titandioxyd (E171)

Deckel: Gelatine, schwarzes Eisenoxyd (E172), gelbes Eisenoxyd (E172), Patentblau (E131), Titandioxyd (E171)

Packung zu 15 Kapseln

ZUM EINNEHMEN

VORSICHT: VOR DER ANWENDUNG DIE IN DER GEBRAUCHSINFORMATION ANGEgebenEN ANWEISUNGEN AUFMERKSAM LESEN

Das Arzneimittel für Kinder unzugänglich und nicht sichtbar aufbewahren.

Den leeren Behälter oder eventuelle Überbleibsel nicht in die Umwelt zerstreuen.

INHABER DER ZULASSUNG

HEXAL S.p.A. - Via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Mailand)

ZULASSUNG 033987052

Charge Nr. Verfallsdatum

Das erwähnte Verfallsdatum betrifft das vollständig verpackte und richtig aufbewahrte Produkt.

Nicht rezeptpflichtig

Preis €

Packungsbeilage

LOPERAMIDE HEXAL 2 mg Hartkapseln LOPERAMIDE HEXAL 2 mg Brausetabletten LOPERAMIDE 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen

Generikum

ZUSAMMENSETZUNG

LOPERAMIDE HEXAL 2 mg Hartkapseln

Jede Kapsel enthält:

Wirkstoff: Loperamidchlorhydrat 2 mg, entspr. Loperamid 1,8 mg**Sonstige Bestandteile:** Lactose, Maisstärke, Magnesiumstearat, Talkum

Körper der Kapsel: Gelatine, schwarzes Eisenoxyd (E172), Titandioxyd (E171)

Deckel: Gelatine, schwarzes Eisenoxyd (E172), gelbes Eisenoxyd (E172), Patentblau (E131), Titandioxyd (E171).

LOPERAMIDE HEXAL 2 mg Brausetabletten

Jede Brausetablette enthält:

Wirkstoff: Loperamidchlorhydrat 2 mg, entspr. Loperamid 1,8 mg**Sonstige Bestandteile:** Hypromellosephthalat, Propylenglykol, solide halbsynthetische Glyceride, Siliciumhydrat, wasserfreie Zitronensäure, Natriumsaccharin, Natriumcyclamat, Natriumcitrat,

Natriumhydrogencarbonat, Calciumlactatmonohydrat, Trimagnesiumdicitrat, Kaliumbikarbonat,

Natriumkarbonat, Natriumchlorid, wasserfreie Glucose, Zitronenaroma.

LOPERAMIDE HEXAL 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen

Jedes ml Lösung zum Einnehmen enthält:

Wirkstoff: Loperamidchlorhydrat 2 mg, entspr. Loperamid 1,8 mg**Sonstige Bestandteile:** Methylparahydroxybenzoesäure, Propylenglykol, Natriumsaccharin, gereinigtes

Wasser, "Contramaram"-Aroma, Himbeeraroma.

DARREICHUNGSFORM UND INHALT

LOPERAMIDE HEXAL 2 mg Hartkapseln

Hartkapseln

Packung zu 30, 15 und 8 Kapseln

LOPERAMIDE HEXAL 2 mg Brausetabletten

Brausetabletten

Packung zu 30 Brausetabletten

LOPERAMIDE HEXAL 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen

Lösung zum Einnehmen

10 ml Flasche

20 ml Flasche

ARZNEIMITTELGRUPPE

Antidiarrhoikum.

INHABER DER ZULASSUNG

HEXAL S.p.A.

Via Paracelso, 16

20041 Agrate Brianza - Mailand (Italien)

HERSTELLER UND ENDKONTROLLEURE

LOPERAMIDE HEXAL 2 mg Hartkapseln:**Herstellung, Verpackung und Kontrolle**

SALUTAS PHARMA GmbH

Otto-Von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben (Deutschland)

ACRAF S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio, 22

60131 Ancona (Italien)

LOPERAMIDE HEXAL 2 mg Brausetabletten:**Herstellung, Verpackung und Kontrolle**

ASTA MEDICA GMBH

Neustiftgasse 119

A-1070 Wien (Österreich)

ACRAF S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio, 22

60131 Ancona (Italien)

Weitere Kontrollanlage

SALUTAS PHARMA GmbH

Otto-Von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben (Deutschland)

LOPERAMIDE HEXAL 2 mg Lösung zum Einnehmen:**Herstellung, Verpackung und Kontrolle**

LOMAPHARMA - RUDOLPH LOHMANN GMBH

Langes Feld 5

31860 Emmerthal (Deutschland)

ACRAF S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio, 22

60131 Ancona (Italien)

Weitere Kontrollanlage

SALUTAS PHARMA GmbH

Otto-Von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben (Deutschland)

THERAPEUTISCHE INDIKATION

LOPERAMIDE HEXAL ist für die Behandlung der akuten und chronischen Diarrhöformen geeignet. Nach einer Ileostomie trägt dieses Arzneimittel zur Verringerung der Stuhlgänge und des Volumens sowie zur Erhöhung der Stuhlkonsistenz bei.

GEGENANZEIGEN

Festgestellte individuelle Überempfindlichkeit gegenüber den Bestandteilen.

LOPERAMIDE HEXAL nicht anwenden, wenn jegliche Hemmung der Darmperistaltik zu vermeiden ist.

Kontraindiziert unter 12 Jahren.

ANWENDUNGSWARNHINWEISE

Schwangerschaft und Stillzeit:

Bei schwangeren Frauen, vor allem im ersten Trimenon, das Produkt nur wenn tatsächlich notwendig und unter direkter Arztkontrolle anwenden.

Das Arzneimittel Kindern unter 4 Jahren wegen der Möglichkeit einer relativen Überdosierung nicht verabreichen. Relative Überdosierung ist Folge einer möglichen nicht voll entwickelten Leberfunktionsfähigkeit, die für den Metabolismus von Loperamid wesentlich ist (siehe "Überdosierung").

WECHSELWIRKUNGEN

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

BESONDERE WARNHINWEISE

Das Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

DOSIS, ART UND ZEIT DER VERABREICHUNG

2 mg Lösung = 30 Tropfen

Akute Diarrhöe**Erwachsene:** Die Anfangsdosis beträgt 4 mg (2 Kapseln oder 2 Brausetabletten oder 60 Tropfen); darauf 2 mg (1 Kapsel oder 1 Brausetablette oder 30 Tropfen) nach jedem nicht festen (weichen) Stuhlgang. Höchste Tagesdosis: 16 mg.**Chronische Diarrhöe**

Mit einer für jeden Patienten angemessenen Dosis kann fast immer eine normale Defäkation erreicht werden.

Erwachsene: Die tägliche Anfangsdosis beträgt 4 mg (2 Kapseln oder 2 Brausetabletten oder 60 Tropfen). Diese Anfangsdosis anpassen, bis 1 oder 2 feste Stuhlgänge täglich erreicht werden, was gewöhnlich mit einer täglichen Erhaltungsdosis von 1-6 Kapseln oder Brausetabletten möglich ist. Die Brausetabletten in einem Glas Wasser lösen.

ÜBERDOSIERUNG

Im Falle einer irrtümlichen Verabreichung bei Kindern unter 4 Jahren könnten infolge einer absoluten (zufällige Einnahme von zu hohen Dosen) oder einer relativen Überdosierung (Anhäufung des nicht metabolisierten Arzneimittels im Blut, obwohl es zu den richtigen Dosen verabreicht wurde) Verstopfung und, wie bei vielen anderen Arzneimitteln (z.B. Sulfonamiden), aufgrund der unvollständigen Reifung der Blutliquorschranke Nebenwirkungen auftreten, wie Depression des Zentralnervensystems, zusammen mit Schläfrigkeit und Bradypnoe. In diesem Fall den Patienten über 48 Stunden streng überwachen, um eine eventuelle Depression des Zentralnervensystems festzustellen. Falls notwendig, eine symptomatische Behandlung einleiten; kein spezifisches Antidot ist erforderlich.

UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Mit Ausnahme weniger seltener Fälle von mäßigen Leibschmerzen und Mundtrockenheit sind sogar nach einer langdauernden Behandlung keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Die Beachtung der in der Packungsbeilage enthaltenen Anweisungen setzt die Gefahr von Nebenwirkungen herab.**Es ist wichtig, dem Arzt oder dem Apotheker das Auftreten jeglicher sogar in dieser Packungsbeilage nicht beschriebenen Nebenwirkung zu melden.**

VERFALLSDATUM UND LAGERUNG

Vorsicht: Das Arzneimittel nach dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum nicht anwenden.

REVISION DER PACKUNGSBEILAGE DURCH DIE ITALIENISCHEN ARZNEIMITTELAGENTUR:

März 2009