Preparazione H 10,8 mg/g Salbe

Extrakt aus Saccharomyces cerevisiae-Zellen
100 g Salbe enthalten 1,08 g Extrakt aus Saccharomyces cerevisiae-Zellen.
Haifischöl, weiße Vaseline, leichtes Mineralöl, Argobase L2 (flüssiges Paraffin, Wollwachs, Vaseline, wasserfreies Lanolin, Ozokerit, Butylhydroxytoluol [BHT]), Lanolin, Glycerol, Methylparahydroxybenzoat, Propylparahydroxybenzoat, rotes Thymianöl.
Salbe
Tube zu 50 g
Zur topischen Anwendung
Packungsbeilage beachten.
Preparazione H wird für die Behandlung von unkomplizierten äußeren und inneren Hämorrhoiden und Analfissuren angewendet.
Empfohlene Dosis: 2 - 3 Anwendungen der Salbe pro Tag
Tragen Sie die Salbe falls möglich nach jeder Darmentleerung auf: Nehmen Sie den Applikator aus der Packung, nehmen Sie die Schutzkappe ab, bestreichen Sie den Applikator mit etwas Salbe und schrauben Sie ihn auf die Tube; drücken Sie die Tube, bis der Applikator gefüllt ist; führen Sie ihn in den After ein und drücken Sie die Tube, bis eine ausreichende Produktmenge eingeführt wurde; tragen Sie die Salbe auch am äußeren Bereich auf. Reinigen Sie den Applikator nach der Anwendung und setzen Sie die Kappe wieder auf.
Überschreiten Sie nicht die empfohlenen Dosen, ohne vorher den Arzt zu fragen.
Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Beschwerden zum wiederholten Mal auftreten oder Sie eine Änderung in den Beschwerden bemerken.
Für die Behandlung von Hämorrhoiden.
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Verw. bis
Nicht bei Temperaturen von über 25 °C aufbewahren.
In der Originalverpackung aufbewahren.
Das Verfalldatum bezieht sich auf das Produkt bei intakter Verpackung und korrekter Aufbewahrung.
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l.
Via Zambeletti s.n.c.
20021 Baranzate (MI)
Zul.-Nr. 017389103
Ch.-B.
Arzneimittel zur Selbstbehandlung.
WEITERE ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Preparazione H 10,8 mg/g Salbe

Extrakt aus Saccharomyces cerevisiae-Zellen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn die Symptome nach einer kurzen Behandlungsdauer nicht besser oder gar schlechter werden, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:
1. Was ist Preparazione H und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Preparazione H beachten?
3. Wie ist Preparazione H anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Preparazione H aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Preparazione H und wofür wird es angewendet?

Preparazione H ist ein Hämorrhoiden-Mittel, das den Wirkstoff Extrakt aus Saccharomyces cerevisiae-Zellen enthält.
Preparazione H wird für die Behandlung von Folgendem angewendet:
- Unkomplizierte äußere und innere Hämorrhoiden
- Analfissuren.

Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie sich nach einer kurzen Behandlungsdauer nicht besser oder gar schlechter fühlen oder wenn die Beschwerden wiederholt auftreten oder wenn Sie kürzlich eine Änderung in deren Beschaffenheit bemerkt haben.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Preparazione H beachten?

Preparazione H darf NICHT angewendet werden,
- wenn Sie allergisch gegen den Extrakt aus Saccharomyces cerevisiae-Zellen oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels (aufgelistet im Abschnitt 6) sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Apotheker, bevor Sie Preparazione H anwenden.
Geben Sie besonders Acht und informieren Sie Ihren Arzt,
- wenn Sie Preparazione H für einen langen Zeitraum anwenden, weil die Langzeitanwendung von Arzneimitteln zur lokalen Anwendung allergische Reaktionen hervorrufen kann. In diesem Fall muss die Behandlung abgebrochen werden. Ihr Arzt wird Ihnen eine angemessene Behandlung verordnen;
- wenn Blutungen auftreten;
- wenn die Beschwerden weiterhin bestehen.

Anwendung von Preparazione H zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden, auch wenn es sich um rezeptfreie Arzneimittel handelt.
Schwangerschaft und Stillzeit
Wenn Sie schwanger sind oder mit Muttermilch stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden.
Preparazione H kann in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.
Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Bis heute sind keine negativen Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen bekannt.
Preparazione H enthält Methyl- und Propylparahydroxybenzoat, welche allergische (sogar späte) Reaktionen verursachen können.
Preparazione H enthält Lanolin, das örtliche Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) verursachen kann.
Preparazione H enthält Butylhydroxytoluol, das lokale Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) oder Augen- bzw. Schleimhautreizungen hervorrufen kann.

3. Wie ist Preparazione H anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.
Empfohlene Dosis: 2 - 3 Anwendungen der Salbe pro Tag.
- Tragen Sie die Salbe falls möglich nach jeder Darmentleerung auf;
- Nehmen Sie den mit einer Schutzkappe versehenen Applikator aus der Packung;
- Nehmen Sie die Kappe ab, bestreichen Sie den Applikator mit etwas Salbe und schrauben Sie ihn auf die Tube;
- Drücken Sie die Tube der Preparazione H, bis der Applikator gefüllt ist;
- Führen Sie ihn in den After ein und drücken Sie die Tube erneut, um eine ausreichende Produktmenge einzuführen;
- Tragen Sie die Salbe auch am äußeren Bereich auf;
- Reinigen Sie den Applikator nach der Anwendung und setzen Sie die Kappe wieder auf.

Überschreiten Sie nicht die empfohlenen Dosen, ohne vorher den Arzt zu fragen.
Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie sich nach einer kurzen Behandlungsdauer nicht besser oder gar schlechter fühlen oder wenn die Beschwerden wiederholt auftreten oder wenn Sie kürzlich eine Änderung in deren Beschaffenheit bemerkt haben.
Wenn Sie eine größere Menge von Preparazione H angewendet haben, als Sie sollten
Bis heute wurde von keinen Anzeichen einer Überdosierung bei der Anwendung von Preparazione H berichtet.
Wenn Sie die Anwendung von Preparazione H vergessen haben
Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, um die vergessene Dosis nachzuholen.
Wenn Sie die Anwendung von Preparazione H abbrechen
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Bis heute wurde von keinen besonderen Nebenwirkungen bei der Anwendung von

Preparazione H berichtet.
Die Beachtung der in dieser Packungsbeilage enthaltenen Anweisungen verringert das Risiko von Nebenwirkungen.
Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen, das unter der Adresse www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse erreichbar ist.
Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Preparazione H aufzubewahren?

Nicht bei Temperaturen von über 25 °C aufbewahren.
In der Originalverpackung aufbewahren.
Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verw. bis" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.
Es ist wichtig, dass Ihnen die Informationen über das Arzneimittel immer zur Verfügung stehen. Heben Sie daher die Packung und die Packungsbeilage auf.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Preparazione H enthält

- Der Wirkstoff ist ein Extrakt aus Saccharomyces cerevisiae-Zellen. 100 g Salbe enthalten 1,08 g Extrakt aus Saccharomyces cerevisiae-Zellen.
- Die sonstigen Bestandteile sind Haifischöl, weiße Vaseline, leichtes Mineralöl, Argobase L2 (flüssiges Paraffin, Wollwachs, Vaseline, wasserfreies Lanolin, Ozokerit, Butylhydroxytoluol [BHT]), Lanolin, Glycerol, Methylparahydroxybenzoat, Propylparahydroxybenzoat, rotes Thymianöl.

Wie Preparazione H aussieht und Inhalt der Packung
Jede Packung Preparazione H enthält eine Tube Salbe zur lokalen Anwendung zu 25 g oder zu 50 g.
Pharmazeutischer Unternehmer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l.
Via Zambeletti s.n.c.
20021 Baranzate (MI)
Hersteller
Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l. – Aprilia, Italien
Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2021.