

HANDELSGENEHMIGUNG: 046967028

Aspirina influenza e naso chiuso

500 mg / 30 mg Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Acetylsalicylsäure / Pseudoephedrinhydrochlorid

Ein Beutel enthält 500 mg Acetylsalicylsäure und 30 mg Pseudoephedrinhydrochlorid. Enthält Saccharose und Benzylalkohol.

Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

20 Beutel

Zum Einnehmen

Außer Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht zusammen mit anderen Analgetika oder Sympathomimetika anwenden.

Nicht über 30° C aufbewahren.

Bayer Spa - Viale Certosa 130, 20156 Mailand

Zul.-Nr. 046967028

Arzneimittel zur Selbstmedikation

Es wird zur symptomatischen Behandlung von Grippe-symptomen und/oder Erkältungen mit Nasen-/Nasennebenhöhlenkongestion, von Schmerzen und Fieber angewendet.

Falls nicht anders verschrieben, Erwachsene: 1-2 Granulatbeutel pro Dosis. Die Tagesdosis darf nicht 6 Beutel überschreiten.

Aspirina influenza e naso chiuso ist für die Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren indiziert. Jugendlichen unter 16 Jahren darf es nicht verabreicht werden, sofern keine andere ärztliche Anweisung vorliegt.

Das Granulat vor der Einnahme in ein Glas Wasser geben und gut umrühren.

Nehmen Sie das Arzneimittel nicht länger als 3 Tage ohne ärztliche Beratung ein.

Vor der Anwendung die Gebrauchsinformation lesen.

VERFALLSDATUM: (Monat/Jahr) / Chargen-Nr.:



GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATIONEN FÜR DEN ANWENDER

Aspirina influenza e naso chiuso

500 mg / 30 mg Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Acetylsalicylsäure 500 mg, Pseudoephedrinhydrochlorid 30 mg

Lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Anwendung des Arzneimittels sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Wenden Sie dieses Arzneimittel stets genau so an, wie in dieser Gebrauchsinformation beschrieben ist oder wie Ihnen vom Arzt oder Apotheker gesagt wurde.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Für weitere Informationen oder Ratschläge wenden Sie sich bitte an den Apotheker.
- Wenn irgendeine Nebenwirkung auftritt, wenden Sie sich bitte an den Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch, wenn es sich um eine Nebenwirkung handelt, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt ist. Siehe Abschnitt 4.
- Wenden Sie sich an den Arzt, wenn nach 3 Tagen keine Besserung eintritt oder Sie eine Verschlechterung der Symptome bemerken.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Aspirina influenza e naso chiuso und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Aspirina influenza e naso chiuso wissen?
3. Wie ist Aspirina influenza e naso chiuso einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aspirina influenza e naso chiuso aufzubewahren?
6. Packungsinhalt und weitere Angaben

1. Was ist ASPIRINA influenza e naso chiuso und wofür wird es angewendet?

Aspirina influenza e naso chiuso hat schmerzlindernde, entzündungshemmende, fiebersenkende und nasenschleimhautabschwellende Eigenschaften. Das weißgelbliche Granulat enthält zwei Wirkstoffe: Acetylsalicylsäure (Aspirin) und Pseudoephedrinhydrochlorid.

Dieses Arzneimittel wird zur symptomatischen Behandlung der Kongestion der Nase und der Nasennebenhöhlen (Rhinosinusitis) und von Schmerzen und Fieber im Zusammenhang mit Grippe-symptomen und/oder Erkältungen angewendet.

Wenn Sie nur eines dieser Symptome aufweisen, ist die Behandlung mit einem Arzneimittel, das nur einen Wirkstoff enthält, zu bevorzugen.

Wenden Sie sich an den Arzt, wenn nach 3 Tagen keine Besserung eintritt oder Sie eine Verschlechterung der Symptome bemerken.

Aspirina influenza e naso chiuso ist bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren angezeigt.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von ASPIRINA influenza e naso chiuso wissen?

Nehmen Sie Aspirina influenza e naso chiuso nicht ein:

- wenn Sie gegen Acetylsalicylsäure, Pseudoephedrin oder irgendeinen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels (die im Abschnitt 6 angeführt sind) allergisch (überempfindlich) sind;
- wenn Sie eine Vorgeschichte mit Asthma infolge Verabreichung von Salicylaten oder ähnlich wirkenden Substanzen (d.h. nichtsteroidale Antiphlogistika) haben;
- wenn Sie an Magengeschwüren (Geschwüre im Magen) leiden;
- wenn Sie zu Blutungen neigen;
- wenn Sie schwanger sind oder stillen;
- wenn Sie an Leber- oder Niereninsuffizienz leiden;
- wenn Sie an einer schweren Herzinsuffizienz leiden;
- wenn Sie gleichzeitig auch 15 mg (oder mehr) Methotrexat pro Woche einnehmen;
- wenn Sie an sehr hohem Blutdruck oder an einer schweren koronaren Herzkrankheit leiden;
- wenn Sie an einem Engwinkelglaukom leiden
- wenn Sie an Harnverhalt leiden
- wenn Sie gleichzeitig Antidepressiva, die Monoaminoxidase-Hemmer (MAO) enthalten, anwenden (oder in den vorhergehenden zwei Wochen angewendet haben).

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie ASPIRINA influenza e naso chiuso einnehmen:

- wenn Sie gegen Analgetika, Antirheumatika oder Antiphlogistika allergisch (überempfindlich) sind;

- wenn Sie an Allergien (z. B. mit Hautausschlag, Juckreiz, Nesselsucht), Asthma, Heuschnupfen, Schwellung der Nasenschleimhaut (Nasenspolypen) oder chronischen Lungenerkrankungen leiden;
- wenn Sie gleichzeitig blutverdünnende oder thrombozytenaggregationshemmende Arzneimittel (Antikoagulantien) einnehmen;
- wenn Sie Magengeschwüre oder gastrointestinale Blutungen in Ihrer Vorgeschichte haben;
- wenn Ihre Leber- oder Nierenfunktion eingeschränkt ist;
- wenn Sie eine eingeschränkte Herz-Kreislauf-funktion haben (zum Beispiel wenn das Herz das Blut nicht angemessen durch den Körper pumpt, Vorliegen eines reduzierten Blutvolumens, einer größeren Operation, einer Blutinfektion oder schwerer Blutungen);
- wenn Sie kurz vor einem chirurgischen Eingriff (auch einem kleinen Eingriff, wie das Ziehen eines Zahns) stehen, da Acetylsalicylsäure das Risiko einer Blutung auch bei geringen Dosen steigert;
- wenn Sie an Hyperthyreose, leichtem bis mäßigem Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Herzkrankheiten, hohem Augeninnendruck (Glaukom), Prostatavergrößerung leiden oder gegen einige im Arzneimittel enthaltene Bestandteile gegen Husten/Erkältung, z.B.: Phenylefrin und Ephedrin (sympathomimetische Substanzen) empfindlich sind;
- wenn Sie an einem pathologischen Zustand leiden, bei dem die Nieren nicht in der Lage sind Säuren richtig aus dem Organismus (renal-tubuläre Azidose) auszuscheiden. Dies kann ein erhöhtes Risiko von Nebenwirkungen hervorrufen, die auf einen höheren Pseudoephedrinspiegel im Blut zurückzuführen sind;
- wenn Sie gewohnheitsmäßig verschiedene Schmerzmittel (vor allem Kombinationen verschiedener Analgetika) gleichzeitig anwenden. Sie sind dem Risiko einer permanenten Nierenerkrankung ausgesetzt;
- wenn Sie für Gicht anfällig sind. Bei niedrigen Dosen verringert Acetylsalicylsäure die Ausscheidung von Harnsäure mit dem Urin, was einen Gichtanfall auslösen kann;
- wenn Sie an einem G6PD-Mangel (Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase) (eine erbliche Krankheit, die die roten Blutkörperchen angreift) leiden, da hohe Dosen Acetylsalicylsäure zu einer Hämolyse (Vernichtung der roten Blutkörperchen) führen könnte.

Wenn Sie ein generalisiertes Erythem mit Symptomen wie Fieber und Pusteln entwickeln, setzen Sie die Einnahme von Aspirina influenza e naso chiuso ab und befragen Sie den Arzt oder rufen Sie umgehend ärztliche Hilfe. Siehe Abschnitt 4.

Mit der Einnahme von Aspirina influenza e naso chiuso könnten plötzliche Bauchschmerzen oder rektale Blutungen auftreten, die durch eine Entzündung des Kolons (ischämische Kolitis) ausgelöst werden.

Wenn gastrointestinale Symptome auftreten, setzen Sie die Behandlung mit Aspirina influenza e naso chiuso sofort ab und befragen Sie den Arzt oder holen Sie eine ärztliche Beratung ein. Siehe Abschnitt 4.

Die Einnahme von Aspirina influenza e naso chiuso könnte zu einer Verringerung der Blutzufuhr zum Sehnerv führen. Sollte es zu einem plötzlichen Sehverlust kommen, setzen Sie die Einnahme von Aspirina influenza e naso chiuso ab und wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt oder an eine Gesundheitseinrichtung. Siehe Abschnitt 4.

Sollten Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Sportler müssen sich bewusst sein, dass durch die Einnahme dieses Arzneimittels die Ergebnisse der „Antidoping-Tests“ positiv ausfallen können.

Ältere Patienten

Ältere Patienten könnten besonders empfindlich gegenüber Pseudoephedrin reagieren und Schlaflosigkeit empfinden oder Dinge erleben, die nicht wirklich sind (Halluzinationen).

Kinder und Jugendliche

Es besteht ein möglicher Zusammenhang zwischen Acetylsalicylsäure und dem Reye-Syndrom, wenn der Wirkstoff Kindern und Jugendlichen verabreicht wird. Das Reye-Syndrom ist eine sehr seltene Krankheit, die lebensbedrohlich sein kann. Aus diesem Grund darf Acetylsalicylsäure nicht von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ohne ärztliche Beratung eingenommen werden.

Andere Medikamente und Aspirina influenza e naso chiuso

Informieren Sie den Arzt oder Apotheker, wenn Sie bereits weitere Arzneimittel anwenden oder vor Kurzem angewendet haben, einschließlich Arzneimittel zur Selbstmedikation. Die Wirkung der folgenden Arzneimittel kann beeinflusst werden, wenn sie gleichzeitig mit Aspirina influenza e naso chiuso angewendet werden. Informieren Sie Ihren Arzt, damit er die Dosis der unten stehenden Arzneimittel, bei Bedarf, anpassen kann.

Aspirina influenza e naso chiuso kann die Wirkung folgender Arzneimittel steigern:

- Arzneimittel, die das Blut verdünnen und der Blutgerinnung vorbeugen, z.B. Ticlopidin;
- Arzneimittel wie Cortison oder Prednisolon, wenn sie eingenommen oder injiziert werden;
- Digoxin (zur Behandlung von Herzinsuffizienz oder unregelmäßigem Herzschlag): die Menge an Digoxin im Blut wird erhöht;
- Antiphlogistika und Analgetika (nichtsteroidale Analgetika/Antiphlogistika);
- Arzneimittel, die den Blutzuckerspiegel senken (Antidiabetika);
- Methotrexat (könnte das Risiko von Nebenwirkungen steigern);
- Valproinsäure (wird zur Behandlung von Epilepsie verwendet);
- Antidepressiva, einschließlich der Monoaminoxidase-Hemmer;

- Salbutamol-Tabletten, die einen unregelmäßigen oder schnelleren Herzschlag auslösen können. Das Absetzen von Inhaliersprays (in den vorgeschriebenen Mengen) ist nicht erforderlich;
- Andere Arzneimittel, die Phenylefrin und Ephedrin enthalten, oder sympathomimetische Substanzen, wie jene, die in nasenschleimhautabschwellenden Mitteln enthalten sind, z.B. Nasentropfen.

Aspirina influenza e naso chiuso kann die Wirkung folgender Arzneimittel verringern:

- Arzneimittel, die die Ausscheidung von Flüssigkeit aus dem Körper fördern und die Diurese steigern (Aldosteron-Antagonisten und Schleifendiuretika);
- Blutdrucksenkende Arzneimittel (gegen Bluthochdruck wie Guanethidin, Methyl dopa, Betablocker);
- Arzneimittel zur Behandlung von Gicht, die die Ausscheidung von Harnsäure mit dem Urin fördern (z.B. Probenecid, Sulfinpyrazon).

Aspirina influenza e naso chiuso mit Speisen, Getränken und Alkohol

Das Arzneimittel kann mit oder ohne Nahrungsmittel eingenommen werden. Das Granulat muss jedoch vor der Einnahme in ein Glas Wasser gegeben und gut umgerührt werden. Der Genuss von Alkohol zusammen mit der Einnahme von Acetylsalicylsäure kann das Risiko von gastrointestinalen Blutungen steigern und die Reaktionsfähigkeit verringern.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fruchtbarkeit

Aufgrund fehlender Erfahrung mit der Kombination beider Wirkstoffe in Aspirina influenza e naso chiuso, darf das Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Wenn Sie eine Schwangerschaft vermuten oder planen, beraten Sie sich mit dem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden.

Das Produkt gehört zur einer Arzneimittelgruppe (NSAR), die bei Frauen die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnte. Diese Wirkung ist rückgängig, indem man das Arzneimittel absetzt.

Fahrtüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Während der Behandlung mit diesem Arzneimittel, kann Ihre Reaktionsfähigkeit verringert sein. Das Risiko kann steigen, wenn man gleichzeitig mit der Einnahme des Arzneimittels Alkohol trinkt. Dies muss bei Tätigkeiten berücksichtigt werden, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, z.B. Auto fahren.

Aspirina influenza e naso chiuso enthält Saccharose

Dieses Arzneimittel enthält 2g Saccharose (Zucker) je Beutel (das entspricht 0,17 Einheiten Kohlenhydrate). Das ist bei Patienten, die an Diabetes mellitus leiden, zu berücksichtigen. Wenn man Ihnen eine Zuckerintoleranz diagnostiziert hat, wenden Sie sich an den Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden.

Aspirina influenza e naso chiuso enthält Benzylalkohol

Dieses Arzneimittel enthält 3,78 mg Benzylalkohol je Beutel.

Benzylalkohol kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Fragen Sie den Arzt oder den Apotheker um Rat, wenn Sie eine Leber- oder Nierenkrankheit haben. Es können sich nämlich große Mengen Benzylalkohol im Körper ansammeln und Nebenwirkungen (wie metabolische Azidose) hervorrufen.

3. Wie ist ASPIRINA influenza e naso chiuso einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel stets genau nach dieser Gebrauchsinformation oder nach den Anweisungen des Arztes oder Apothekers ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls nicht anders verordnet, empfehlen sich für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren die Dosen in der unten angeführten Tabelle:

Alter	Einzeldosis	Tagesdosis
Erwachsene und Jugendliche	1-2 Beutel	Bis zu 6 Beutel

Die Einzeldosis kann bei Bedarf nach einem Zeitraum von 4 Stunden wiederholt werden. Die Tageshöchstdosis darf nicht 6 Beutel überschreiten.

Geben Sie den Inhalt von einem oder zwei Beuteln Aspirina influenza e naso chiuso in ein Glas Wasser und rühren Sie gut um. Die entstandene Suspension hat einen Orangengeschmack. Trinken Sie sofort das ganze Glas aus. NB: Das Granulat löst sich nicht vollständig auf.

Nehmen Sie das Arzneimittel nicht länger als 3 Tage ohne ärztliche Beratung ein.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Aspirina influenza e naso chiuso ist bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren angezeigt.

Verabreichen Sie das Arzneimittel nicht Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ohne ärztliche Beratung. Aufgrund der geringen Erfahrung können keine Dosiseempfehlungen für Jugendliche angegeben werden.

Wenn Sie mehr Aspirina influenza e naso chiuso eingenommen haben, als Sie sollten

Bei Überdosierung können Kopfschmerzen, Schwindel, Krämpfe, Unwohlsein, Ohrensausen, erhöhter Herzschlag (Tachykardie), Schmerzen in der Brust, Unruhe oder Kurzatmigkeit auftreten.

Sollten Sie eine Überdosierung mit diesem Arzneimittel vermuten, wenden Sie sich umgehend an den Arzt.

Sollten Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich bitte an den Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Häufigkeit: nicht bekannt. Auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Mögliche Nebenwirkungen infolge Anwendung von Acetylsalicylsäure:

Diese Nebenwirkungen sind alle sehr schwerwiegend und könnten umgehende ärztliche Hilfe oder Einlieferung ins Krankenhaus erfordern. Informieren Sie sofort den Arzt oder suchen Sie das nächstgelegene Krankenhaus auf, wenn eines der folgenden Symptome erscheinen sollte:

- Magengeschwüre, die in isolierten Fällen zu Magendurchbruch führen können;
 - Gastrointestinale Blutung, die in isolierten Fällen zu Anämie aufgrund von Eisenmangel führen kann. Die Anzeichen einer gastrointestinalen Blutung sind Ausscheidung von dunklem Stuhlgang oder blutiges Erbrechen;
 - Allergische Reaktionen (wie Atembeschwerden, Hautausschlag mit möglicher Verringerung des Blutdrucks), insbesondere bei Asthmatikern;
 - Hämolyse (Vernichtung der roten Blutkörperchen) im Falle eines starken G6DP-Mangels (Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase);
 - Beeinträchtigung der Nierenfunktion, Niereninsuffizienz.
 - Erkrankung des Zwerchfells (vor allem bei Langzeitbehandlung)
- Diese Nebenwirkungen sind alle schwerwiegend und könnten umgehende ärztliche Hilfe erfordern. Informieren Sie den Arzt, wenn Sie irgendeines der folgenden Symptome bemerken:
- Erhöhung der Blutungsgefahr;

- Gastrointestinale Beschwerden wie Magenschmerzen, schlechte Verdauung und Entzündung der inneren Magenwand;
- Anstieg der Leberproteine (Enzyme);
- Schwindelgefühl, Ohrensausen (Tinnitus).

Leichte Nebenwirkungen:

- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall.

Mögliche Nebenwirkungen von Pseudoephedrin:

Diese Nebenwirkungen sind alle schwerwiegend und könnten umgehende ärztliche Hilfe erfordern. Informieren Sie den Arzt, wenn Sie irgendeines der folgenden Symptome bemerken:

- Wirkungen auf das Herz (z.B. Arrhythmie oder Tachykardie);
- Harnverhalt, insbesondere bei Patienten mit Prostatahyperplasie;
- Anstieg des Blutdrucks, obwohl dies nicht Personen mit kontrolliertem Bluthochdruck betrifft;
- Schlaflosigkeit, selten Halluzinationen und andere Stimulationen des Zentralnervensystems;
- Auswirkungen auf die Haut (z.B. Hautausschlag, Nesselsucht, Juckreiz);
- Das plötzliche Auftreten von Fieber, Hautrötung oder zahlreicher kleiner Pusteln (mögliche Symptome einer akuten generalisierten exanthematischen Pustulose - AGEP) ist innerhalb der ersten beiden Behandlungstage mit Aspirina influenza e naso chiuso möglich.

Siehe Abschnitt 2.

Setzen Sie die Einnahme von Aspirina influenza e naso chiuso ab, wenn Sie diese Symptome entwickeln und wenden Sie sich an den Arzt oder rufen Sie umgehend ärztliche Hilfe.

- Entzündung des Kolons, die auf eine unzureichende Blutzufuhr zurückzuführen ist (ischämische Kolitis).
- Verringerung der Blutzufuhr zum Sehnerv (ischämische Optikusneuropathie).

Leichte Nebenwirkungen:

- Mundtrockenheit

Wenn Sie eine der oben genannten Nebenwirkungen bemerken, **setzen Sie die Einnahme des Arzneimittels ab**. Informieren Sie den Arzt, damit er den Schweregrad der Nebenwirkungen beurteilen und eventuelle Maßnahmen ergreifen kann.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn irgendeine Nebenwirkung auftritt, wenden Sie sich bitte an den Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch, wenn es sich um eine Nebenwirkung handelt, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt ist. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem an die Adresse <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse> melden.

Mit der Meldung von Nebenwirkungen tragen Sie zur besseren Information über die Sicherheit dieses Arzneimittels bei.

5. Wie ist ASPIRINA influenza e naso chiuso aufzubewahren?

Das Arzneimittel außer Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht nach dem auf der Packung und den Beuteln angegebenen Verfallsdatum. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Monatstag. Nicht über 30°C aufbewahren.

Arzneimittel dürfen nicht in das Abwasser und in den Hausmüll entsorgt werden.

Erkundigen Sie sich beim Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Damit tragen Sie zum Umweltschutz bei.

6. Packungsinhalt und weitere Angaben

Was enthält Aspirina influenza e naso chiuso

Die Wirkstoffe sind Acetylsalicylsäure (500 mg) und Pseudoephedrinhydrochlorid (30 mg). Die weiteren Bestandteile sind Zitronensäure, Saccharose, Hypromellose, Saccharin, Orangenaroma (enthält Benzylalkohol, Essigsäure, Alpha-Tocopherol, modifizierte Stärke und Maltodextrin).

Äußere Beschreibung von Aspirina influenza e naso chiuso und Packungsinhalt

Weiß-gelbliches Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen.

Das Produkt ist in Packungen mit 10 oder 20 Beuteln erhältlich.

Es ist möglich, dass nicht alle Packungen in den Handel kommen.

Zulassungsinhaber und Hersteller

Zulassungsinhaber
Bayer Spa
Viale Certosa 130, 20156 Mailand

Hersteller

Bayer Bitterfeld GmbH – Greppin - Deutschland

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Auch wenn das Arzneimittel in anderen Mitgliedsstaaten genehmigt ist, wird es möglicherweise nicht überall in den Handel gebracht.

Deutschland:	ASPIRIN COMPLEX 500 mg / 30 mg Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Österreich:	Aspirin Complex Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Bulgarien:	Аспирин Комплекс 500 mg / 30 mg Гранули за перорална суспензия
Kroatien:	Aspirin Complex 500 mg/30 mg granule za oralnu suspenziju
Zypern:	Aspirin Complex Cold&Flu
Griechenland:	Aspirin Complex Cold&Flu
Italien:	Aspirina influenza e naso chiuso 500mg/30mg granolato per sospensione orale
Ungarn:	Aspirin Complex 500 mg / 30 mg granulátum belsóleges szuszpenzióhoz
Polen:	Aspirin Complex Zatoki 500 mg / 30 mg Granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej
Portugal:	Aspirina Complex 500 mg/30 mg granulado para suspensão oral
Rumänien:	ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală
Slowenien:	Aspirin Complex 500 mg/30 mg zmca za peroralno suspenzijo
Slowakei:	ASPIRIN COMPLEX 500 mg / 30 mg Granulát na perorálnu suspenziju

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2022